

小心「麻」煩找上你，籲請民眾提高警覺

依據疾管署監測資料顯示，我國今(2025)年累計36例麻疹病例，其中12例為國內感染病例，另24例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

衛生局局長陳南松說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，病患及家屬進出醫院，民眾出入醫療機構應落實呼吸道與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。醫療照護人員應落實感控措施，如工作內容或場所具有暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低病毒傳播風險。

衛生局提醒，請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。另提醒如被匡列為接觸者之民眾，請自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新臺幣6至30萬元罰鍰。

陳南松局長再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有滿12個月及滿5歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。1966年(含)以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前一劑MMR疫苗接種時間超過15年或1966年(含)以後出生之成人，若需前往麻疹流行區(如越南、印度、柬埔寨)，經醫師評估後需接種之民眾可自費至醫療院所接種(日本、韓國非屬麻疹流行區)疫苗數量有限，建議接種前自行洽詢醫療院所諮詢相關接種訊息，有關更多麻疹病毒之介紹，請詳見：<https://ntshb.tw/hc03MvQrA>，亦可撥打防疫專線1922或本局防疫專線049-2220904洽詢。