

小小藥片，大大風險！

南投縣政府呼籲正確使用「吩坦尼口頰溶片」

「小小一片，止痛有力，但也暗藏風險！」南投縣政府衛生局長陳南松提醒鄉親，吩坦尼（Fentanyl）是一種比嗎啡強效 50 至 100 倍的止痛藥，常用於癌症或劇烈疼痛的患者，雖能帶來快速止痛效果，但若使用不當，不僅會造成頭暈、嗜睡、便秘，甚至可能引發呼吸抑制或成癮，危害相當大！

源和藥局陳雨函藥師提供專業解說，吩坦尼口頰溶片為第二級管制藥品，屬於強效合成鴉片類止痛藥，有效成分為「檸檬酸吩坦尼(Fentanyl citrate)」，其藥效發揮快速，通常在使用後 5 至 10 分鐘內即可緩解癌症患者的突破性劇痛，應嚴格依醫師處方使用，切勿自行增減劑量，以避免成癮或濫用風險。

為了守護鄉親健康，衛生局呼籲民眾務必遵守正確使用四大要點：1. 切勿咀嚼、吞食、撕裂或切割藥片。2. 每次用藥間隔至少 2 小時，每日最多不得超過 4 次。3. 若需同時使用多片，請勿將藥品重疊放入口腔。4. 服藥 5 分鐘後可飲水，但藥片完全溶解前避免進食。

目前經食品藥物管理署核准輸入之劑量規格有 200 微公克與 600 微公克，僅能在醫師處方下使用，患者應遵守醫囑規範，若止痛效果不足，應立即回診，由醫師評估後調整處方，切勿自行加量。剩餘藥品也不得隨意丟棄或轉交他人使用，應繳回原處方醫療院所統一報廢處理，以免流入非法管道。

陳南松局長特別呼籲：「正確用藥不僅是治療的關鍵，更是守護生命的第一步。請大家一定要遵循醫師與藥師的專業指示，才能遠離成癮風險。」

民眾如藥品許可證相關疑問請查詢，衛生福利部食品藥物管理署網站/業務專區/藥品/資訊查詢/藥品許可證查詢(<https://ntshb.tw/nth05PAfYn>)；或洽南投縣政府衛生局諮詢專線 049-2230518。