

กำหนดการปัจจุบันของการฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับเด็กในไต้หวัน

เวอร์ชัน 2025.01

[illegible]

1.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) เปลี่ยนจาก 24 ชั่วโมงหลังคลอด เป็น 5 เดือนหลังคลอด (ช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนที่แนะนำคือ 5-8 เดือนหลังคลอด)

2.เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนเข็มแรกสำหรับไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น (Chimeric virus) (JE-CV LiveAtd vaccine) เมื่อครบ 15 เดือนหลังคลอด วันช่วง 12 เดือนก่อนฉีดเข็มที่ 2

3.การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ครั้งแรกของเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี ควรฉีด 2 เข็ม โดยฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ วัคซีนครั้งแรกของเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป จะฉีดเพียง 1 เข็ม โดสนโยบายปัจจุบันได้กำหนดให้เด็กชั้นประถมศึกษารับการฉีดวัคซีนจากงบประมาณรัฐบาล 1 เข็ม สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เด็กอายุ 8 ปีหรือต่ำกว่า หากผู้ปกครองเห็นว่าจำเป็น สามารถชำระค่าใช้จ่ายเองได้ และฉีดเว้นช่วงห่าง 4 สัปดาห์ หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่โรงเรียน

4.ตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป กำหนดให้เด็กที่เกิดหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2560 และอายุมากกว่า 12 ปี รับการฉีดวัคซีนชั้นดับอักเสบ เอ ตลอดจนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหมู่บ้านบนภูเขา 30 แห่ง หมู่บ้านตำบลในพื้นที่ราบใกล้กับหมู่บ้านบนภูเขา 9 แห่ง และเทศบาลจินเหมินและเหลียนเจียง ซึ่งได้รับเงินงบประมาณของรัฐบาลสำหรับฉีดวัคซีนดับอักเสบ เอ และตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เด็กชั้นประถมศึกษาตั้งแต่เกรด 6 รวมทั้งเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน