



潛伏結核感染治療處方一覽表

(臺灣 2014)

112年印製

處方	處方藥品	總劑數與療程頻率	劑量			常見副作用	使用限制	都治 (DOPT)	推薦順序 (接觸者除指標抗藥或使用限制外)
			每日最大劑量	兒童	成人				
1HP ^a	複方	Isoniazid(INH) 300mg+ Rifapentine (RPT) 300mg	28天 (1個月) 每日服用	300mg	固定1顆	皮疹(蕁麻疹)為主、(少數)肝毒性	◆ 指標個案INH或RMP抗藥之接觸者 ◆ <13歲兒童 ◆ 孕婦 ^c	必須	推薦處方
		Rifapentine (RPT) 150mg	300mg	◆ 35-45 kg 1顆 ◆ >45 kg 2顆					
	單方	Isoniazid (INH) 300mg	28天 (1個月) 每日服用	300mg	300 mg				
		Rifapentine (RPT) 150mg	600mg	◆ <35 kg 300 mg ◆ 35-45 kg 450mg ◆ >45 kg 600 mg					

潛伏結核感染治療處方說明

處方	處方藥品		總劑數與療程頻率	劑量			常見副作用	使用限制	都治 (DOPT)
				每日最大劑量	兒童	成人			
1HP ^a	複方	Isoniazid(INH)300mg ⁺ Rifapentine(PRT)300mg	28 天 (1 個月) 每日服用	300mg	固定 1 顆		皮疹(蕁麻疹)為主、(少數)肝病性	◆ 指標個案 INH 或 RMP 抗藥之接觸者 ◆ <13 歲兒童 ◆ 孕婦 ^c	必須
		Rifapentine(PRT)150mg		300mg	◆ 35-45kg 1 顆 ◆ >45g 2 顆				

備註

1HP 及 3HP 處方使用之 INH300 及 HP 複方為專案進口藥品，須個案簽立藥品使用同意書

目前尚位有足夠之孕婦臨床安全性相關試驗數據

3 viên
3 เม็ด
3 tablet
共 3 顆

1HP (28天) 每日最大劑量
INH 300mg、RPT 600mg

複方

 

$\left(\begin{matrix} \text{INH} \\ 300\text{mg} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{RPT} \\ 300\text{mg} \end{matrix} \right) \rightarrow 1 \text{ 顆}$ 及 $\begin{matrix} \text{RPT} \\ 150\text{mg} \end{matrix} 2 \text{ 顆}$

共3顆