

潛伏結核感染治療處方說明
รายการใบสั่งยารักษาการติดเชื้อวัณโรคแฝง

泰文

處方 ใบสั่งย	處方藥品 ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์		總劑數與 療程頻率 ปริมาณยา ทั้งหมดแล ความถี่ขอ การรักษา	劑量 ขนาดยา			常見 副作用 ผลข้างเคียงที่พบบ่อย	使用限制 ข้อจำกัดในการใช้	都治 (DOPT)
				每日 最大劑量 ขนาดยาสุ สุดต่อวัน	兒童 เด็ก	成人 ผู้ใหญ่			การรักษา ภายใต้การดู แลโดยตรง (DOPT)
1HP ^a	複方 สูตรผสม (สูตรค ที่)	Isoniazid(INH)300mg ⁺ Rifapentine(PRT)300mg	28 天 (1 個月) 每日服用	300mg	固定 1 顆 คงที่ 1 เม็ด		皮疹(蕁麻診)為主、 (少數)肝病性 ผื่น (ลมพิษ) เป็นหลัก, ความเป็นพิษต่อดับ	◆指標個案 INH 或 RMP 抗藥之接觸 者 ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยดัชนี มีการดื้อยา INH หรือ RMP ◆<13 歲兒童 เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ◆孕婦 ^c หญิงตั้งครรภ์	必須 จำเป็น
		Rifapentine(PRT)150mg	28 วัน (1 เดือน) รับประทาน ทุกวัน	300mg	◆35-45kg 1 顆 35-45 กก.: 1 เม็ด ◆>45g 2 顆 >45 กก.: 2 เม็ด				

備註 หมายเหตุ:

1HP 及 3HP 處方使用之 INH300 及 HP 複方為專案進口藥品，須個案簽立藥品使用同意書

ใบสั่งยา 1HP และ 3HP ใช้ INH 300 มก. และสูตรผสม HP เป็นยานำเข้าเฉพาะโครงการ ต้องขอให้ผู้ป่วยลงนามในหนังสือยินยอมให้ยา

目前尚位有足夠之孕婦臨床安全性相關試驗數據

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการทดลองทางคลินิกที่เพียงพอกับความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

3 viên

3 เม็ด

3 tablet

共 3 顆

1HP (28天) 每日最大劑量
INH 300mg、RPT 600mg

複方

 

$\left[\begin{matrix} \text{INH} \\ 300\text{mg} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{RPT} \\ 300\text{mg} \end{matrix} \right] \rightarrow 1 \text{顆}$ 及 $\begin{matrix} \text{RPT} \\ 150\text{mg} \end{matrix} 2 \text{顆}$

共3顆