

藥品名稱及功用

項次	品名	用法	功用	禁忌
1	理冒伯樂止痛錠 Fucole Paran Tablets	每次 1 顆/一天 3 次	退燒,止痛(緩解頭痛,牙痛,咽喉痛,關節痛,神經痛,肌肉酸痛,月經疼痛)	1.曾發生藥物過敏症狀者。 2.不可與酒精併用。 3.每日服用 Acetaminophen 成分不宜超過 4000 毫克。
2	咳炎淨膠囊 Cotazym Capsules	每次 1 顆/一天 3 次	鎮咳、祛痰	1.曾發生藥物過敏症狀者。 2.正在使用 MAOI 治療的患者
3	理冒永克風膠囊 Fucole Cold Capsules	每次 1 顆/一天 3 次	緩解感冒之各種症狀 (鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)	1.曾發生藥物過敏症狀者 2.這個藥可能會導致暈眩，服用藥物後不要開車或使用危險機械 3.不可與酒精併用。 4.每日服用 Acetaminophen 成分不宜超過 4000 毫克。 5. 不要服用本藥超過七日。 6.避免再服用含咖啡因藥品、飲料
4	秘福糖衣錠 Conslife S.C. Tablets	每次 1 顆/一天 2 次	便秘及緩和便秘所伴生之下列諸症狀：腹部膨滿、腸內異常發酵、食慾不振	1.曾發生藥物過敏症狀者 2.孕婦不宜大量服用。 3.長期使用可能因耐藥性增大而藥效減弱。 4.痙攣性便秘、肛門裂創、潰瘍性痔核者禁用。 5.懷疑為急性腹部症狀、痙攣性便秘之患者禁用
5	維朗糖衣錠 Vilon S.C. Tablets	每次 1 顆/一天 1 次	維生素 B 群補充劑	1.曾發生藥物過敏症狀者 2.嚴重肝腎機能障礙患者，血液凝固不正常，及服用抗凝血劑者，需特別小心謹慎。 3.遇有消化器潰瘍，重症的肝，腎機能障礙或血液 凝固機能不全時不可使用本劑。 4.接受手術(拔牙)請告知(牙)醫師正在服用本藥。 5.伴有感染症者宜併用適宜抗生物質或化學療法劑。
6	允消菌軟膏 Winsolve-B Ointment	一天 3 次	緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染	1.曾發生藥物過敏症狀者 2.不得施於眼睛四周或黏膜(口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部 3.使用後請保持塗抹部位透氣，勿密

項次	品名	用法	功用	禁忌
				封，以免增加副作用 4.勿使用大面積之體表(勿超過兩手掌面積為參考) 5.使用部位或周圍有髒汙請清洗乾淨後用藥
7	允消舒黴乳膏 10公絲 Winsolve Sulnafine Cream	一天 3 次	治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑	1.曾發生藥物過敏症狀者 2.不得施於眼睛四周或黏膜(口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部 3.使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用 4.勿使用大面積之體表(勿超過兩手掌面積為參考) 5.使用部位或周圍有髒汙請清洗乾淨後用藥
8	非炎酸痛水性貼布 Voren Patch	必要時	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	1. 曾發生藥物過敏症狀者 2.非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能會影響懷孕和 / 或胚胎 / 胎兒發育。 懷孕 30 週以上之孕婦，應避免使用。 懷孕 20 至 30 週之孕婦，用藥前須經醫師確認有使用必要，並以最低有效劑量及最短期間治療；若治療時間超過 48 小時，可能需要以超音波監測羊水狀態。 懷孕未滿 20 週之孕婦及可能懷孕婦女，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
9	非炎凝膠 Voren-G Gel	必要時	短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛	1.曾發生藥物過敏症狀者 2.不得施於眼睛四周或黏膜(口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部 3.使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用 4.勿使用大面積之體表(勿超過兩手掌面積為參考) 5.使用部位或周圍有髒汙請清洗乾淨後用藥